

Памятка женщинам перед прохождением диспансеризации:



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН (18-49 ЛЕТ)

1 ЭТАП



**ОСМОТР
АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ**

ПАЛЬПАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ



**ОСМОТР ШЕЙКИ МАТКИ
С ЗАБОРОМ МАТЕРИАЛА НА
ИССЛЕДОВАНИЕ**



**МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛАГАЛИЩНЫХ МАЗКОВ**



**ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА С
ПОВЕРХНОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ
И ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА**

**В ВОЗРАСТЕ 18 – 29 ЛЕТ – ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
МЕТОДОМ ПЦР (МИКОПЛАЗМЫ, ХЛАМИДИИ)**



2 ЭТАП



**В ВОЗРАСТЕ 30 – 49 ЛЕТ –
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАЗКОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ**



**УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
В НАЧАЛЕ ИЛИ СЕРЕДИНЕ
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА**

УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ



**ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР
АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ**

Женщинам необходимо помнить, что забор мазков с шейки матки не проводится во время менструации, при проведении того или иного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний органов малого таза, что для снижения вероятности получения ложных результатов анализа мазка необходимо исключить половые контакты в течение 2-х суток перед диспансеризацией, отменить любые вагинальные препараты, спермициды, тампоны и спринцевания.